


**ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ**

**Е.М. Евтушенко
М.Ф. Тимербулатова
8(347)285-10-05
Ufa.rkpc@doctorrb.ru**

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДО 90% САМОУБИЙСТВ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ



■ Психические расстройства ■ Другое



ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА
ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА
РАССТРОЙСТВА АДАПТАЦИИ

ВОЗРАСТ

ПОЛ

**ХАРАКТЕР
ПРОЯВЛЕНИЙ**

Субклинические психопатологические проявления

у 10%



Наиболее высокий
уровень
суицидальных
тенденций
формируется
к 12 годам

**ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - РАННЯЯ И ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ



ОБУЧАЮЩИЕСЯ
7-8 КЛАССОВ
9-11 КЛАССОВ
СТУДЕНТЫ 1 КУРСА ТЕХНИКУМОВ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

РАЙОНЫ И
ГОРОДА С
ВЫСОКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
СУИЦИДОВ



↓
ВЫЯВЛЕНО

20%



5930

наблюдений

С ПОГРАНИЧНЫМИ
ПСИХИЧЕСКИМИ Р-ВАМИ
ИЗ НИХ



36%

с СУИЦИДАЛЬНЫМИ
ТЕНДЕНЦИЯМИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР




2020 АМБУЛАТОРНО
846 СТАЦИОНАРНО
из них 457 В ДНЕВНОМ




РЕЗУЛЬТАТЫ

НА ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ




- Невротические, связанные со стрессом и соматоформные р-ва
- Эмоциональные р-ва и р-ва поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

НА ЭТАПЕ СТАЦИОНАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ



■ F43.25 ■ F43.22 ■ F41.2



■ F92.8 ■ F98.9 ■ F91.2 ■ F93.3

ВЫВОДЫ

НАЧАЛО ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ Р-ВА И Р-ВА
ПОВЕДЕНИЯ С НАЧАЛОМ В
ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ

$p=0,002$

10 и 14 лет

НЕВРОТИЧЕСКИЕ Р-ВА,
СВЯЗАННЫЕ СО СТРЕССОМ И
СОМАТОФОРМНЫЕ Р-ВА

МАХ.

13 лет

$p=0,031$

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ПОКАЗАЛИ ПРЕОБЛАДАНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРАКТИЧЕСКИ У ВСЕХ ОБСЛЕДОВАННЫХ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛИГАТНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ФАКУЛЬТАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ ПОКАЗАЛО ПРЕОБЛАДАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ, БЕСПОКОЙСТВА И СНИЖЕННОГО ФОНА НАСТРОЕНИЯ КАК ПРИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ, ТАК И ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ.

