

Некоторые показатели общественного психического здоровья у студентов медицинских вузов.

к.м.н. доцент Makeenko B.B. (ВМедА),
makeenko2001@mail.ru;

к.м.н. доцент Кузнецов С.В. (ДВГМУ),
ksv73@yandex.ru.

Санкт – Петербург
2021 г.

Актуальность: за последние 25 лет распространенность функциональных отклонений среди юношей (17 лет) возросла на 170 %, а среди их сверстниц девушек – на 118 %. *(НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ, 2014).*


Цель исследования: выявление зависимости между качеством жизни и склонности к девиантности и эмпатии у студентов медицинских ВУЗов Санкт – Петербурга и Хабаровска.

Материалы и методы: все испытуемые были обследованы с помощью экспериментально-психологического метода.

Использовались следующие методики: опросник качества жизни (версия ВОЗ), опросник ИСАДА, направленный на определение склонности к девиантному поведению, опросник на эмпатию.


	I группа (Санкт – Петербург)		II группа (Хабаровск)	
Всего человек	30 (100 %)		30 (100 %)	
Девушки \ Юноши	19 (63,3 %)	11 (36,7 %)	25 (83,3 %)	5 (16,7 %)
Средний возраст	23,2 ± 0,37 лет		21,9 ± 0,19 лет	
По семейному положению:				
•Холост	22 (73,3%)		21 (70,0 %)	
•Официальный брак	3 (10,0 %)		5 (16,7 %)	
•Незарегистрированный брак	4 (13,3 %)		4 (13,3 %)	
По социальному происхождению:				
•Из крестьян	3 (10,0 %)		5 (16,7 %)	
•Из предпринимателей	3 (10,0 %)		4 (13,3 %)	
•Из служащих	8 (26,7 %)		4 (13,3 %)	
•Из рабочих	16 (53,3 %)		17 (56,7 %)	

Качество жизни



ИСАДА

С
р
е
д
н
и
й



■ СПб
■ Хабаровск

P < 0.01

Выводы:

- 1) Общий уровень КЖ в группе СПб (средний балл $92,8 \pm 1,73$) выше, чем в группе Хабаровск (средний балл $86 \pm 1,97$) на 7,9% ($p < 0,05$).
- 2) Склонность к девиантному поведению студентов медицинских ВУЗов зависит от качества жизни. Соответственно, чем ниже уровень жизни, тем выше склонность к девиантности и наоборот. Обнаружена обратная средняя связь между КЖ и склонностью к девиантному поведению в СПб ($r = -0,52$; $p < 0,01$) и в Хабаровске ($r = -0,68$; $p < 0,001$).
- 3) Преобладающими типами склонности к девиантному поведению в обеих группах явились варианты избегающий, суицидальный, делинкветный, аддиктивный.
- 4) Установлена взаимосвязь показателей девиантного поведения с эмпатией к незнакомым людям, животным, художественной литературе, т.е. «отстранённым эмпатическим категориям», между тем категория «ближнего круга» (родители, дети и старики) не вызывала должного эмпатического ответа (группа СПб).
- 5) Достоверной взаимосвязи между качеством жизни и эмпатией выявлено не было.