

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВЕТИАПИНА В СЛУЧАЕ КЛИНИЧЕСКИ СФОРМИРОВАННОГО СИНДРОМА ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕГАБАЛИНА

Евдокимов Андрей Григорьевич

канд. мед. наук, врач психиатр-нарколог

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер».

evdokimovvgmu@gmail.com

Волгоград - 2021

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- ▶ Проблема злоупотребление рецептурными и безрецептурными медицинскими препаратами приобретает проблемы мирового масштаба (Hughes et al. [1999](#) ; Casati et al. [2012](#)).
- ▶ Не меньший интерес представляют возникшие проблемы со злоупотреблением некоторыми противосудорожными препаратами, такие как клоназепам или **прегабалин** (Loftus and Wright [2014](#)).
- ▶ Прегабалин одобрен для лечения частичной эпилепсии, генерализованного тревожного расстройства, периферической и центральной нейропатической боли и фибромиалгии с допустимым диапазоном доз от 150 до 600 мг/день (Parazisis and Tzachanis [2014](#)).
- ▶ На сегодняшний день зарегистрировано несколько случаев **зависимого поведения** в связи с неправильным употреблением препарата (Al-Husseini A, Wazaify M, et al. [2018](#)), а также развитие галлюцинаторно-бредовой симптоматики (Nordgaard J, Jürgens G. 2015).

Цель исследования: поиск препарата для купирования сомато-вегетативных проявлений абстинентного синдрома при злоупотреблении препаратом прегабалин, в связи с отсутствием стандартов оказания специализированной медицинской помощи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для количественной оценки главного психопатологического синдрома наркомании – патологического влечения и синдрома нарушенного сознания болезни при наркомании использовались разработанные и клинически опробованные оценочные шкалы (критерии) патологического влечения к психоактивному веществу.

Для оценки субъективного восприятия пациента влияния самого заболевания и проводимого лечения на его физическое, психологическое, эмоциональное и социальное функционирование использовался опросник SF-36 (Health status profile — Short form 36).

Шкала общего клинического впечатления (Clinical Global Impression Scale — CGI) использовалась для оценки проводимого лечения нейролептическими препаратами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОПРОСНИК SF-36

№	Шкалы	Результаты в начале исследования (баллы)	Результаты в конце исследования (баллы)
1	Физическое функционирование (PF)	60	95
2	Ролевое физическое функционирование (RP)	32	97
3	Боль (BP)	62	84
4	Общее здоровье (GH)	45	87
5	Жизнеспособность (VT)	15	70
6	Социальное функционирование (SF)	12,5	87,5
7	Ролевое эмоциональное функционирование (RE)	30	90
8	Психологическое здоровье (MH)	24	64

РЕЗУЛЬТАТЫ

ШКАЛА ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Результаты в начале исследования (баллы)	Результаты в конце исследования (баллы)
«небольшое улучшение» (3 балла)	«большое улучшение» (2 балла)

ВЫВОДЫ

Использование нейролептической терапии в виде препарата Кветиапин в дозировке 300 мг/сут. позволило значительно снизить уровень патологического влечения в рассматриваемом клиническом случае и повысить уровень качества жизни пациента. Что в свою очередь, позволит мотивировать зависимого человека на дальнейшие реабилитационные мероприятия.