

КОМОРБИДНОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ-МУЖЧИН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

Линчук А.Д.¹, Расторгуев А.Г.¹, Павлова Е.Н.¹,
Хамарханова А.А.¹, Петрунько О.В.²

¹ ОГКУЗ Иркутская областная клиническая
психиатрическая больница №1

электронный адрес: linchuk43@mail.ru

² Иркутская государственная медицинская академия
последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России

электронный адрес: petrounko@mail.ru

Актуальность и цель исследования


- Пациенты с психическими расстройствами входят в группу повышенного риска в отношении ВИЧ-инфекции в связи с частым злоупотреблением психоактивными веществами и стереотипом сексуального поведения с беспорядочными половыми связями.
- Психически больные часто недооценивают тяжесть соматического состояния, не выполняют врачебные предписания, уклоняются от лечения ВИЧ-инфекции.

Цель исследования: изучение коморбидности психических расстройств и ВИЧ-инфекции у пациентов-мужчин, находящихся на принудительном лечении.

Материалы и методы


- Из 514 пациентов, находящихся на принудительном лечении в мужских отделениях специализированного и общего типов в ОГКУЗ Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1 на 31.12.2020 года, выделена группа 38 пациентов (7,4%) с впервые выявленной или подтвержденной ранее ВИЧ-инфекцией.
- Диагностика психических расстройств осуществлялась в соответствии с критериями МКБ-10.
- Все пациенты с ВИЧ-инфекцией находились под динамическим наблюдением врача-инфекциониста с проведением необходимой лабораторной диагностики.

**Распределение пациентов по типу
принудительного лечения**




Результаты исследования


Распределение пациентов по возрасту



Распределение пациентов по диагнозу МКБ-10



Распределение пациентов по совершенному ООД



Длительность пребывания пациентов с коморбидной ВИЧ-инфекцией на принудительном лечении на момент исследования варьировала от одного года до 8,5 лет.

ВИЧ-инфекция у пациентов-мужчин, находящихся на принудительном лечении

- Длительность заболевания ВИЧ-инфекцией варьировала от 1 года до 24 лет, средняя длительность заболевания – 10,7 лет.
- Из 38 больных ВИЧ-инфекцией только 60,5% (n=23) принимали высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ).
- На момент исследования 39,5% (n=15) пациентов не получали ВААРТ по следующим причинам: отсутствие показаний к антиретровирусной терапии (n=8), проходили дообследование у инфекциониста для решения вопроса о назначении терапии (n=2), ВААРТ была временно отменена в связи с подбором другой схемы лечения (n=3), лишь 2 пациента отказались от лечения, в связи с выраженными побочными эффектами от разных схем терапии.
- У 95,7% пациентов, которые регулярно получали ВААРТ, при исследовании иммунного статуса количество CD4 клеток было выше $200 \cdot 10^9$ л.
- На момент исследования ни у одного из пациентов не было выявлено оппортунистических заболеваний.

Выводы

- Терапия пациентов с психическими расстройствами и ВИЧ-инфекцией, находящихся на принудительном лечении, требует мультидисциплинарного подхода с обязательным взаимодействием с областным центром СПИД и участием врача-инфекциониста в динамическом наблюдении за данной категорией лиц, наряду с привлечением узких специалистов при необходимости.
- Проведение психофармакотерапии при приеме ВААРТ требует обязательного учета лекарственных взаимодействий назначаемых препаратов и мониторинга переносимости лечения.
- Своевременная и регулярная ВААРТ у психически больных, находящихся на принудительном лечении, позволяет не только задержать развитие СПИДа и оппортунистических заболеваний, но и предотвратить дальнейшую передачу ВИЧ-инфекции половым путем после окончания стационарного этапа терапии.
- В условиях пандемии COVID-19 должны быть сведены к минимуму риски перебоев с поставками лекарственных препаратов для ВААРТ с целью обеспечения непрерывности терапии; требуется разработка алгоритма вакцинации от COVID-19 психически больных с ВИЧ-инфекцией с учетом противопоказаний.