



ВИМПАТ®
лакосамид

Базовый препарат для Монотерапии фокальной эпилепсии

- Оптимальный контроль эпилептических приступов в монотерапии фокальной эпилепсии^{1,2}
- Возможность применения в режимах монотерапии и политерапии^{1,2}
- Высокая эффективность в лечении неконтролируемых эпилептических приступов^{1,2}



Краткая инструкция по применению препарата Vimpat®

Действующее вещество: Лакосамид. Формы выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой: 50 мг, 100 мг, 150 мг или 200 мг. Раствор для инфузий 10 мг/мл, 200 мг раствора во флаконе.

Показания: В качестве монотерапии или дополнительной терапии парциальных судорожных приступов, сопровождающихся или не сопровождающихся вторичной генерализацией, у взрослых и подростков (16-18 лет) с эпилепсией.

Способ применения и дозы: Внутрь. Суточная доза делит на 2 приема – обычно утром и вечером, вне зависимости от приема пищи. Монотерапия: Рекомендуемая начальная доза составляет 50 мг два раза в день, которая должна быть увеличена до начальной терапевтической дозы 100 мг два раза в день по истечении 1-й недели. Лечение лакосамидом может быть также начато с дозы 100 мг 2 раза в день на основании оценки врача необходимого снижения судорожной активности по сравнению с риском побочных эффектов. В зависимости от ответа и переносимости, поддерживающая доза может быть увеличена на 100 мг/сут (по 50 мг два раза в день) с интервалами в неделю, вплоть до максимальной суточной поддерживающей рекомендуемой дозы 600 мг/сут (по 300 мг два раза в день). Если при достижении дозировки свыше 400 мг/сут у пациента сохраняется необходимость в приеме дополнительных противосудорожных препаратов, необходимую суточную дозу лакосамида можно увеличить до максимальной суточной поддерживающей рекомендуемой дозы 100 мг два раза в день по истечении 1-ой недели. В зависимости от ответа и переносимости, доза может быть увеличена на 100 мг/сут (по 50 мг два раза в день) с интервалами в неделю, вплоть до максимальной суточной поддерживающей рекомендуемой дозы 400 мг/сут (200 мг два раза в день). **Бистерапия:** Для инфузий: Внутривенно в течение 15-60 минут 2 раза в день. Рекомендуемая начальная доза составляет 50 мг два раза в день, которая должна быть увеличена до начальной терапевтической дозы 100 мг два раза в день по истечении 1-ой недели. В зависимости от ответа и переносимости, доза может быть увеличена на 100 мг/сут (по 50 мг два раза в день) с интервалами в неделю, вплоть до максимальной суточной поддерживающей рекомендуемой дозы 400 мг/сут (200 мг два раза в день). **Раствор:** Раствор можно вводить как дополнительное разведение или разведение. Известен опыт использования раствора для инфузий длительностью не более 5 дней. Следует переводить на пероральный прием препарата сразу, как только это станет возможным. Лечение лакосамидом может быть начато с базовой концентрации дозы 200 мг, с последующим назначением суточной приблизительно 12 мг/сут. 100 мг два раза в сутки (200 мг/сут) поддерживающего режима дозирования. Начальная доза может применяться у пациентов в ситуациях, когда врач определяет, что быстрое достижение равновесной концентрации в плазме и терапевтический эффект гарантированы. Это должно применяться под медицинским контролем, учитывая возможное увеличение числа нежелательных реакций со стороны

Высок и сред. Эффект, безопасность и переносимость у пациентов пожилого возраста сопоставимы с пациентами с newly diagnosed epilepsy a phase 3, randomized, double-blind, non-inferiority trial. Lancet. 2011; 19(1): 43-54

центральной нервной системы. Лечение препаратом Vimpat® может быть начато как с приема таблеток внутрь, так и с внутривенного введения раствора для инфузий. При необходимости можно заменить прием таблеток внутривенным введением без повторного прихода дозы и наоборот. При этом не следует менять суточную дозу и кратность применения (2 раза в день).

Противопоказания: Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Агривентрикулярная блокада II или III степени. Возраст до 16 лет.

С осторожностью: У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤ 30 мл/мин). У пациентов с нарушением проводимости в синусовом или АВ-узловом отделах, а также с высокой степенью блокады АВ-узла. У пациентов с нарушением проводимости в пучке Гиса. У пациентов с повышенным риском заблуждений сердца. В комбинации с препаратами, которые вызывают удлинение интервала QT.

Побочные реакции: Самыми частыми побочными реакциями были головная боль, тошнота и диарея. Другие частые и частые побочные реакции: депрессия, спутанность сознания, бессонница, головокружение, головная боль, нарушение равновесия, нарушение координации движений, нарушение памяти, когнитивные нарушения, сонливость, тремор, нистагм, гипестезия, дисагрия, нарушение внимания, парестезия, диплопия, нечеткость зрения, вертиго, шум в ушах, тошнота, рвота, запор, метеоризм, диспепсия, сухость во рту, диарея, зрительная слепота, мышечные спазмы, нарушение походки, астения, утомляемость, раздражительность, чувство онемения, парезы, повреждение кожного покрова при получении травмы (из-за нарушения координации движений и головокружений), ушибы. Выраженность некоторых побочных реакций зависит от дозы и уменьшается после ее снижения. Частота и тяжесть побочных реакций со стороны центральной нервной системы ЦНС и желудочно-кишечного тракта обычно уменьшаются со временем. Применение лакосамида сопровождается дозозависимым удлинением интервала QT.

Взаимодействие: Результаты исследований in vitro свидетельствуют о низкой вероятности взаимодействия лакосамида с другими препаратами.

Полную информацию о побочных эффектах и нежелательных взаимодействиях читайте в инструкции по применению препарата. Регистрационное удостоверение: Таблетки – ЛСР-09187/09, раствор для инфузий – ЛСР-09147/09.

Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению перед назначением препарата.



За дополнительной информацией обращайтесь:
ООО «ЮСБ Фарма», 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд д. 15. Тел.: 8 495 644-3322, факс: 8 495 644-3329
E-mail: medinfo.rus@ucb.com, www.ucbrussia.ru
RU-P-BR-EPOS-1900016