



Открытое сравнительное рандомизированное исследование эффективности и безопасности Тенотена в терапии тревоги при ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии (АГ)¹

АГ II-III стадии или ИБС
+ тревожное расстройство



4
недели

ЛЕЧЕНИЕ



4
недели

НАБЛЮДЕНИЕ



51



31



20



РУ ЛП-Н (000029)-(PF-RU) 18.12.2019



3 раза
в день



+ Стандарт*

Тофизопам
50 мг 2 р/д + Стандарт*

Сочетание «стандартная терапия + Тенотен» способствует улучшению динамики гемодинамических показателей за счет снижения выраженности тревоги

ТЕНОТЕН

ТОФИЗОПАМ



Систолическое АД Диастолическое АД

* Стандарт – стандартная терапия АГ/ ИБС (гипотензивные препараты, антиангинальные препараты, антиагреганты)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ТЕНОТЕН

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата ТЕНОТЕН²

Регистрационный номер и дата ЛП-Н (000029)-(PF-RU) 18.12.2019

Торговое название Тенотен

Лекарственная форма Таблетки для рассасывания.

Фармакотерапевтическая группа: анксиолитическое средство

Показания к применению Тенотен показан к применению у взрослых.

Тревожные состояния при невротических и неврозоподобных состояниях, психосоматических заболеваниях; стрессорных расстройств с повышенной нервной напряженностью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями, в составе комплексной терапии. РУ ЛП-Н (000029)-(PF-RU) 18.12.2019

Тревожные состояния при неврологических расстройствах дисциркуляторного происхождения, сопровождающиеся неустойчивостью эмоционального фона, раздражительностью, снижением памяти, вегетативными нарушениями, в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Беременность и период лактации

Безопасность применения Тенотена у беременных и в период лактации не изучалась. При необходимости приема препарата следует учитывать соотношение «польза-риск».

Способ применения и дозы

Риска не предназначена для деления таблетки на части.

Внутрь. На один прием – 1 или 2 таблетки (держать во рту до полного растворения – не во время приема пищи). Принимать 2 раза в день; при необходимости – до 4 приемов в сутки. Курс лечения – 1-3 месяца; при необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев или повторить через 1-2 месяца.

При отсутствии стойкого улучшения состояния в течение 3-4 недель после начала лечения, необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.

Особые указания

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

В связи с наличием в действии препарата Тенотен активирующих свойств, последний прием осуществлять не позже, чем за 2 часа до сна.

Влияние на способность управлять транспортными средствами

Отрицательного влияния препарата Тенотен на способность управлять транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами не выявлено.

Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек Без рецепта.



Более полную информацию можно прочесть в инструкции по медицинскому применению препарата



ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

Россия, 127473, Москва, 3-й Самотечный пер., дом 9
Тел./факс (495) 684-43-33

www.tenoten.ru

1. Ванчакова Н.П., Попов А.П. Тревожные расстройства у пациентов с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца и опыт их коррекции Тенотеном. Поликлиника, 2007; 2 :56-60

2. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения препарата Тенотен.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ