

# РЕСПИМАТ®

## создает облачко, которое просто вдохнуть<sup>1-6</sup>

### Легочная депозиция >58%\*<sup>5</sup>

### Всего 3 шага для применения ингалятора Респимат®:1

#### 1 Поверните



#### 2 Откройте



#### 3 Нажмите



\* Исследование проведено в условиях in vitro. Данные приведены для среднетяжелой степени обструкции и исследуемого вещества тиотропия бромид.

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Спирива® Респимат®.
2. Hochrainer D. et al. // J Aerosol Med. 2005;18(3):273-282.
3. Pitcairn G. et al. // J. Aerosol Med. 2005. 18 (3): 264-272.
4. Brand P. et al. // Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2008; 3(4):763-70.
5. Ciciliani A.M. et al. // Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 May 26;12:1565-1577
6. Kimberly H. Davis et al // Health Qual Life Outcomes. 2017; 15: 201.

Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата **Спирива® Респимат®**. Перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению. **Регистрационный номер:** ЛП-000890. **Торговое название:** СПИРИВА® РЕСПИМАТ®. **Международное название:** тиотропия бромид. **Лекарственная форма:** раствор для ингаляций. **Состав:** одна ингаляционная доза содержит: активное вещество: тиотропия - 2,5 мкг (тиотропия бромид моногидрат – 3,1235 мкг). **Фармакотерапевтическая группа:** М-холиноблокатор. **Показания:** для поддерживающего лечения пациентов с ХОБЛ, хроническим бронхитом, эмфиземой легких; поддерживающей терапии при сохраняющейся одышке; улучшения качества жизни, нарушенного вследствие ХОБЛ, и снижения частоты обострений, в качестве дополнительной поддерживающей терапии у пациентов с 6 лет с бронхиальной астмой, с сохраняющимися симптомами заболевания на фоне приема, по крайней мере, ингаляционных глюкокортикостероидов; для уменьшения симптомов бронхиальной астмы, улучшения качества жизни и снижения частоты обострений. **С осторожностью:** закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы, обструкция шейки мочевого пузыря. **Противопоказания:** препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ противопоказан больным, у которых ранее отмечалась гиперчувствительность к любому компоненту этого препарата, к атропину или его производным, например, ипратропию бромиду, окситропию бромиду. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** препарат не должен применяться у беременных или кормящих грудью женщин, если потенциальная польза для матери не превышает потенциальный риск для плода и ребенка. На период применения препарата необходимо прекратить кормление грудью ребенка. **Способ применения и дозы:** рекомендуемая терапевтическая доза составляет две ингаляции спрея из ингалятора РЕСПИМАТ (5 мкг/терапевтическая доза) один раз в день, в одно и то же время суток. **Побочное действие:** часто (≥1/100, <1/10); незначительная проходящая сухость слизистой оболочки (глотки). **Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению.** **Условия хранения:** при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Использовать в течение 3 месяцев после первой ингаляции. Хранить в недоступном для детей месте. **Срок годности:** 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

ООО «Берингер Ингельхайм» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3.  
Тел. +7 (495) 544 50 44, факс +7 (495) 544 56 20 www.boehringer-ingenheim.ru

 **Boehringer  
Ingelheim**